









# REGISTROS ORNITOLÓGICOS








## REGISTROS ORNITOLÓGICOS INFORME 1999-2000


**Coordinación, redacción y revisión bibliográfica por Javier Prieta  
Recopilado por Javier Prieta, Jesús Valiente y José María Benítez**

El presente informe se refiere a los años 1999 y 2000, aunque también incluye numerosos datos de años anteriores. El total de especies de aves consideradas es de 316, trece más que en el informe de 1998. No obstante, esta vez se tratan en dos listas diferentes, una lista primera que contiene las 298 especies con presencia confirmada en Extremadura y una segunda, denominada lista B, que reúne otras 18 especies con citas dudosas o procedentes de escapes de aves cautivas, así como aves raras cuyas citas no han sido aún homologadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología).

El número de colaboradores que ha aportado información de cualquier tipo supera las 150 personas, un número realmente elevado para el desarrollo que tiene la ciencia ornitológica en Extremadura. La mayor parte de estos colaboradores son ornitólogos extremeños, pero hay una participación muy importante de visitantes de otras regiones y países, que en muchos casos aportan una visión diferente y más amplia de la ornitología. Por este motivo se incluyen resúmenes en inglés, dado el interés mostrado por este público extranjero a la hora de participar y adquirir este Anuario, a pesar de los inconvenientes del idioma. Todos ellos son los verdaderos autores y creadores de este Anuario y su contribución desinteresada a un mejor conocimiento de la avifauna extremeña ayudará sin duda alguna a facilitar su conservación.

El presente informe pretende además servir de recopilación de toda la información sobre aves en Extremadura publicada de una u otra forma (revistas científicas y divulgativas, prensa, congresos, comentarios personales, etc.). De este modo, se incluyen numerosos resúmenes más o menos amplios de trabajos recientes de seguimiento e investigación de las aves extremeñas; lo que también contribuye a divulgar datos dispersos y a veces de difícil acceso. No obstante, el grueso de la información corresponde a datos cedidos por voluntarios, si bien parte de esta participación se debe al esfuerzo de los editores por localizar a los posibles colaboradores y por consultar foros telemáticos (Avesforum), relatos de viajes publicados en Internet y otras publicaciones impresas (Quercus, Ardeola). En todos los casos se cuenta con el permiso de los autores de las observaciones inéditas, pero si en algún caso esto no ha ocurrido, desde aquí pedimos las debidas disculpas.





En comparación al Anuario de 1998, la estructura del texto es algo diferente y la sencilla enumeración de citas aisladas ha sido sustituida por la redacción de breves textos, cuando ha sido posible, más elaborados. El mayor inconveniente de esta decisión es la de hacer interpretaciones equivocadas, achacables sólo al redactor, pero que seguro servirán para animar al debate y permitirán en futuros Anuarios la expresión de nuevas opiniones de otras personas.

En este segundo informe anual de Registros Ornitológicos se sigue el esquema del primer informe 1998 utilizado en el volumen 1:

**NOMBRE.** Nombre castellano y científico según las recomendaciones de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), con algunas excepciones.

**ESTATUS REGIONAL.** Breve descripción de la situación de cada especie en el ámbito extremeño. Los datos más habituales recogidos son grado de abundancia, fenología, hábitats utilizados, tendencias, poblaciones, movimientos, número de citas para especies raras y observaciones excepcionales.


**CRITERIO.** Guía de orientación para los colaboradores de futuros anuarios. Se trata de criterios flexibles sujetos a modificación en función de la opinión de los colaboradores.

**CITAS.** Contribuciones aportadas por los colaboradores. La labor de los editores se limita a la selección, ordenación y redacción de las citas. Para cada cita se indica localidad, fecha, número, sexo y edad de los individuos, y observador/es, y si es necesario se añaden comentarios más amplios del autor o de los editores. Por razones obvias, en algunas especies sensibles no se especifican las localidades.

En este segundo informe se incluyen observaciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2000, no existiendo límite para fechas anteriores. Este mismo criterio se mantendrá en futuros números con el fin de recuperar valiosos datos de años previos. El contenido de las citas publicadas en este volumen debe servir como orientación al lector para su colaboración en futuros anuarios.

## SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS MÁS DESTACADOS.

- Colimbo chico (*Gavia stellata*). Primera cita en la región.
- Somormujo lavanco (*Podiceps cristatus*). Mayor concentración citada en Extremadura: más de 1.000 ej. en el embalse del Cubilar.
- Cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*). Citas estivales de hasta 150 ej. en el embalse de Arrocampo y 2.700 ej. en enero en el embalse de Valdesalor.
- Garcilla cangrejera (*Ardeola ralloides*). Primeras reproducciones en Extremadura en dos lugares de Badajoz (río Guadiana) y Cáceres (Arrocampo).
- Ardéidas. Nuevas localidades de cría para garza real (*Ardea cinerea*), garza imperial (*Ardea purpurea*), martinete común (*Nycticorax nycticorax*) y garceta común (*Egretta garzetta*).





- Garceta grande (*Egretta alba*). Aumenta el número de observaciones.
- Espátula común (*Platalea leucorodia*). Primeras reproducciones en Extremadura, al menos en dos lugares de la provincia de Cáceres.
- Ánsar campestre (*Anser fabalis*). Segunda y tercera citas.
- Ánsar común (*Anser anser*). Invernada en aumento.
- Barnacla canadiense (*Branta canadensis*). Primera cita homologada.
- Barnacla carinegra (*Branta bernicla*). Segunda cita regional.
- Tarro canelo (*Tadorna ferruginea*). Permanecen 12 meses en el embalse de Los Canchales.
- Pato mandarín (*Aix galericulata*). Primera cita homologada.
- Cerceta carretona (*Anas querquedula*). Posible caso de reproducción.
- Cuchara común (*Anas clypeata*). Mayor concentración citada en Extremadura: más de 15.000 ej. en el embalse de Sierra Brava.
- Cerceta Americana (*Anas carolinensis*). Primera cita homologada.
- Milano negro (*Milvus migrans*) y milano real (*Milvus milvus*). Se detectan síntomas de declive, sobre todo en el segundo. Se incluye un amplio resumen de un estudio reciente.
- Alimoche común (*Neophron percnopterus*). Censo 2000: 166-181 pp.
- Buitre negro (*Aegyptius monachus*). Censo 2000: cerca de 600 pp.
- Aguilucho pálido (*Circus cyaneus*). Primer censo invernal parcial, 1999: 25 ej.
- Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*). Fuerte declive, sólo quedan 600 pp. (2001), la mitad que hace 5 años.
- Aguilucho papialbo (*Circus macrourus*). Primer registro homologado.
- Águila imperial ibérica (*Aquila adalberti*). Resumen de varios trabajos publicados. Hay 38 pp. (2001) en Extremadura.
- Águila perdicera (*Hieraaetus fasciatus*). Censo 2000: 93 pp.
- Águila pescadora (*Pandion haliaetus*). Resumen del seguimiento por satélite de aves británicas. Una ave inverna 7 meses en el embalse de Gabriel y Galán.
- Polluela pintoja (*Porzana porzana*). Tres nuevas citas, seis en total.
- Grulla común (*Grus grus*). Cifras bajas: en 2000-2001 invernan la mitad de los ejemplares habituales.
- Canastera común (*Glareola pratincola*). Nuevas colonias en los Llanos de Cáceres.
- Chorlitejo grande (*Charadrius hiaticula*). Grupo de más de 100 ej. en el embalse de Los Canchales, el mayor citado en Extremadura.
- Chorlito carambolo (*Charadrius morinellus*). Grupo de 75 ej. en La Serena, el mayor citado en Extremadura.
- Avefría europea (*Vanellus vanellus*). Citas estivales, a veces más de 200 ej.
- Chocha perdiz (*Scolopax rusticola*). Resumen de un estudio regional.
- Archibebe patigualdo chico (*Tringa flavipes*). Primera cita homologada.
- Vuelvepedras (*Arenaria interpres*). Siete citas nuevas, hay 14 en total.
- Falaropo picofino (*Phalaropus lobatus*). Segunda cita regional.
- Falaropo picogruoso (*Phalaropus fulicarius*). Segunda y tercera citas.
- Gaviota enana (*Larus minutus*). Segunda cita regional.



## AVES DE EXTREMADURA

- Gaviota reidora (*Larus ridibundus*). Datos de cría en Extremadura.
- Gaviota de Audouin (*Larus audouini*). Primera cita.
- Gavión atlántico (*Larus marinus*). Primera cita.
- Gaviota tridáctila (*Rissa tridactyla*). Primera cita.
- Pagaza piquirroja (*Sterna caspia*). Tercera cita.
- Fumarel cariblanco (*Chlydonia hybridus*). Tres nuevas colonias de cría.
- Paloma torcaz (*Columba palumbus*). Resumen de investigación sobre la invernada. Citas de dormitorios invernales de hasta 800.000 ej.
- Tórtola turca (*Streptopelia decaocto*). Resumen de un estudio sobre su rápida expansión en Extremadura.
- Tórtola común (*Streptopelia turtur*). Resumen de un estudio sobre su declive.
- Búho campestre (*Asio flammeus*). Posible caso de reproducción.
- Vencejo pálido (*Apus pallidus*). Nuevas localidades de cría.
- Carraca europea (*Coracias garrulus*). Resumen de varios estudios.
- Alzacola (*Cercotrichas galactotes*). Fuerte declive.
- Colirrojo real (*Phoenicurus phoenicurus*). Primeros datos de cría en Gredos.
- Mirlo capiblanco (*Turdus torquatus*). Varias citas otoñales en Villuercas.
- Buscarla unicolor (*Locustella luscinioides*). Única localidad de cría conocida en el embalse de Arrocampo.
- Carricerín real (*Acrocephalus melanopogon*). Cría por segunda vez en Mérida y cría probable en el embalse de Arrocampo.
- Mosquitero silbador (*Phylloscopus sibilatrix*). Segunda observación.
- Mosquitero común (*Phylloscopus collybita*). Varias citas en época de cría.
- Herrerillo capuchino (*Parus cristatus*). Cría en encinares de Badajoz.
- Gorrión moruno (*Passer hispanoliensis*). Enorme aumento.
- Bengalí rojo (*Amandava amandava*). Fuerte expansión en Cáceres.
- Tejedor amarillo (*Euplectes afer*). Primeras citas de cría.
- Pico de coral (*Estrilda astrild*). Expansión al norte y al sur del Guadiana.

## Observaciones dudosas pendientes de confirmar:

- Marabú africano (*Leptotilos crumeniferus*). Dos primeras citas.
- Serreta grande (*Mergus merganser*). Primera cita.
- Chorlitejo culirrojo (*Charadrius vociferus*). Primera cita.
- Papamoscas papirrojo (*Ficedula parva*). Primera cita.
- Primeras observaciones en libertad de varias aves exóticas escapadas de cautividad: tortolita rabilarga (*Oenas capensis*), cacatúa ninfa (*Nymphicus hollandicus*) y loro barranquero (*Cyanoliseus patagonus*).

## ORNITHOLOGICAL RECORDS 1999-2000 BIRD REPORT

**Compiled by Javier Prieta, Jesús Valiente y José María Benítez**

The present Bird Report primarily refers to the years 1999 and 2000, but also includes numerous records from previous years. The total number of species considered was 316, thirteen more than the previous 1998 Bird Report. Nevertheless, this time we have considered two different lists, the first or "A" list containing the 298 species whose presence has been confirmed in Extremadura and a second list or "B" list with another 18 species whose records are unconfirmed or refer to escaped or released captive birds, or rare birds whose presence has not still been accepted by the Spanish Rarities Committee (SEO/Bird Life).

The number of people collaborating was 151, a genuinely large number for the region. Most of them were ornithologists from Extremadura, but there was a very important collaboration from birdwatchers from other Spanish regions and other countries, which in many cases give a different and much broader perspective of ornithology. All of them are the makers and authors of this Bird Report and their contribution to improving the knowledge of the birds in Extremadura will undoubtedly help towards their conservation.

In addition, this report also aims to compile all the information published, in one form or another, about the birds of Extremadura (in newspapers, magazines, scientific journals and ornithological meetings). In this way we are publishing information that in some cases was previously difficult to obtain, so that the number of birds in this study is more extensive than when only using data from volunteers. This knowledge, added to the data of all those individuals collaborating will help to provide a more precise view of the status of the birds in Extremadura.

The most interesting records in this Bird Report 1999-2000 are as follows:

- Red-throated Grebe (*Gavia stellata*). First record in Extremadura.
- Great Crested Grebe (*Podiceps cristatus*). Concentration of more than 1,000 in the Cubilar reservoir.
- Great Cormorant (*Phalacrocorax carbo*). Summer concentration of more than 150 in the Arrocampo reservoir and a winter group of 2,700 in the Valdesalor reservoir.



## AVES DE EXTREMADURA


- Squacco Heron (*Ardeola ralloides*). First breeding in Extremadura in the River Guadiana (Badajoz) and the Arrocampo reservoir (Cáceres).
- Herons. New breeding locations for Grey Heron (*Ardea cinerea*), Purple Heron (*A. purpurea*), Night Heron (*Nycticorax nycticorax*) and Little Egret (*Egretta garzetta*).
- Great White Egret (*Egretta alba*). An increase in the number of records.
- Eurasian Spoonbill (*Platalea leucorodia*). First breeding in at least two sites in the Cáceres Province.
- Bean Goose (*Anser fabalis*). Second and third records.
- Greylag Goose (*Anser anser*). An increase in the number of wintering birds.
- Canada Goose (*Branta canadensis*). First accepted record.
- Brent Goose (*Branta bernicla*). Second record.
- Ruddy Shelduck (*Tadorna ferruginea*). Birds present for 12 months in the Los Canchales reservoir.
- Mandarin Duck (*Aix galericulata*) First accepted record.
- Garganey (*Anas querquedula*). Possible first breeding record.
- Green-winged Teal (*Anas carolinensis*). First accepted record.
- Northern Shoveler (*Anas clypeata*) More than 15,000 birds in the Sierra Brava reservoir, the largest ever concentration in Extremadura.
- Black Kite (*Milvus migrans*) and Red Kite (*M. milvus*). Signs of population declines, especially in Red Kite. A summary of a recent study is included.
- Egyptian Vulture (*Neophron percnopterus*) Year 2000 census: 156 to 178 pairs.
- Monk Vulture (*Aegypius monachus*). Year 2000 census: some 600 pairs.
- Hen Harrier (*Circus cyaneus*). First partial winter census in 1999: 25 birds.
- Montagu's Harrier (*Circus pygargus*). Important decline, only 600 pairs left in 2001, half that of five years before.
- Pallid Harrier (*Circus macrourus*). First accepted record.
- Spanish Imperial Eagle (*Aquila adalberti*). Summaries from several papers are included. There are 38 pairs (2001) in Extremadura.
- Bonelli's Eagle (*Hieraetus fasciatus*). Year 2000 census: 93 pairs.
- Osprey (*Pandion haliaetus*). Summary on the satellite tracking of British ospreys. A female wintered for 7 months in the Gabriel y Galán reservoir.
- Spotted Crake (*Porzana porzana*). Three new records, six in total.
- Common Crane (*Grus grus*). Half of usual numbers spent the 2000-2001 winter in Extremadura.
- Collared Pratincole (*Glareola pratincola*). New colonies in the plains of Cáceres.
- Great Ringed Plover (*Charadrius hiaticula*). One hundred birds observed in Los Canchales reservoir, the largest concentration reported in Extremadura.
- Dotterel (*Charadrius morinellus*). 75 birds in La Serena, the largest group reported in Extremadura.
- Northern Lapwing (*Vanellus vanellus*). Summer groups of more than 200.
- Woodcock (*Scolopax rusticola*). Summary of a regional study.



- Lesser Yellowlegs (*Tringa flavipes*). First accepted record.
- Turnstone (*Arenaria interpres*). Seven new records, 14 in total.
- Red-necked Phalarope (*Phalaropus lobatus*). Second record.
- Grey Phalarope (*Phalaropus fulicarius*). Second and third records.
- Little Gull (*Larus minutus*). Second record.
- Black-headed Gull (*Larus ridibundus*). Breeding data.
- Audouin's Gull (*Larus audouinii*). First record.
- Great Black-backed Gull (*Larus marinus*). First record.
- Kittiwake (*Rissa tridactyla*). First record.
- Caspian Tern (*Sterna caspia*). Third record.
- Whiskered Tern (*Chlidonias hybridus*). Three new breeding colonies.
- Common Wood Pigeon (*Columba palumbus*). Summary of a study on winter birds. Winter roost records of up to 800,000 birds.
- Eurasian Collared Dove (*Streptopelia decaocto*). Summary of the increase in numbers.
- European Turtle Dove (*Streptopelia turtur*). Summary of its decline.
- Short-eared Owl (*Asio flammeus*). Possible breeding.
- Pallid Swift (*Apus pallidus*). New breeding locations.
- European Roller (*Coracias garrulus*). Summaries of various studies.
- Rufous-tailed Scrub-robin (*Cercotrichas galactotes*). Strong decline.
- Common Redstart (*Phoenicurus phoenicurus*). First breeding in the Gredos mountains.
- Ring Ouzel (*Turdus torquatus*). Autumn records in Villuercas mountains.
- Savi's Warbler (*Locustella luscinioides*). Only breeding location is the Arrocampo reservoir.
- Moustached Warbler (*Acrocephalus melanopogon*). Bred for the second time in Mérida and possibly bred at the Arrocampo reservoir.
- Wood Warbler (*Phylloscopus sibilatrix*). Second record.
- Common Chiffchaff (*Phylloscopus collybita*). Some observations in the breeding season.
- Crested Tit (*Parus cristatus*). Breeding in holm oak woodland in Badajoz.
- Spanish Sparrow (*Passer hispaniolensis*). Enormous population increase.
- Avadavat (*Amandava amandava*). Considerable expansion in Cáceres.
- Common Waxbill (*Estrilda astrild*). Expanding north and south of the river Guadiana.




Records pending acceptance by the Spanish Rarities Committee:

- African Adjutant (*Leptotilos crumeniferus*). First and second records.
- Goosander (*Mergus merganser*). First record.
- Killdeer Plover (*Charadrius vociferus*). First record.
- Red-breasted Flycatcher (*Ficedula parva*). First record.



## AVES DE EXTREMADURA

- First records in the wild of escaped captive exotic birds: Namaqua Dove (*Oenas capensis*), Cockatiel (*Nymphicus hollandicus*) and Burrowing Parakeet (*Cyanoliseus patagonus*).



## LISTADO DE COLABORADORES

A continuación se presentan los nombres de los colaboradores que han aportado las citas con las que ha sido posible elaborar este Informe de Registros Ornitológicos. Los casos de omisión o error rogamos sean disculpados.


Antonio Acha	Manuel Curiel
J.C. Adame	Consuelo da Silva
Ginés Alcobendas Ventas	Eduardo de Juana
Toribio Álvarez	Juan Carlos del Moral
Mario Arcas Martín	Juan Carlos Delgado Expósito
Luis Asuar	Arturo Díaz
Toby Austin	Richard Dunn
Jesús Avilés	Joan Estrada
R.M. de Ayala	Atanasio Fernández García
Yves Baptiste	José María Fernández (Instituto Alavés de la Naturaleza)
Juan Antonio Barquero	Juan José Ferrero
José María Benítez Cidoncha	José Fimia
Carlos Javier Bernal Chacón	José Fortúnez Franco
Francisco Javier Briz Lázcoz	Eladio García de la Morena
Jesús Caballero	Juan Antonio García Jiménez
Francisco Javier Caballero Gómez	Jesús Manuel García Luengo
Jesús Calle Vaquero	Nicolas Gauthier
Javier Caldera	Guillermo González Bornay
Manuel Calderón	Elena Gómez
Aurelio Capilla (Grupo Alcor)	Manuel Gómez Calzado
José Enrique Capilla Nicolás	Francisco Gragera Díaz
Marcelino Javier Cardalliaguet	José Luis Guisado
Luis Carrera	Pablo Gutiérrez
Charo Casado	Torbjorn Hasund
José María Casas	Jacobo Hernández
Antonio Castellano	Letizia Herrera
J.M. Clavel	Rafael Herrero
Colectivo Ornitológico Sterna	M. Hirschler
Dolores Conejo	Honeyguide Wildlife Tours
Casimiro Corbacho	Jaime Iglesias Duarte
Pedro Corbacho	José Iñesta
María Cortés	Alan Jack
Emilio Costillo Borrego	



AVES DE EXTREMADURA

Jerónimo Jaén  
 Javier Juárez  
 Hermann Knüwer  
 Koen Lavens  
 Arturo López Gallego  
 Francis Lloret  
 Luis Lozano  
 Juan Andrés Malo de Molina  
 Inés Malpica  
 Javier Marchamalo de Blas  
 Federico J. Marín Rodríguez  
 Rafael Martín  
 José María Martínez Pescador  
 Antonio Mateos Martín  
 Juan Matute  
 Joaquín Mazón  
 Andy McLevy  
 Francisco José Medina  
 Francisco Mesquida  
 Alfredo Mirat  
 Agustín Mogena  
 Bernd Möckel  
 Blas Molina  
 Neil Money  
 Francisco Montaña Vázquez  
 Mario Morales  
 Gerardo Moreno  
 José Manuel Morera  
 John L. Muddeman  
 Diego Navarro Bonilla  
 Jorge Nubla  
 Juan Carlos Núñez Arjona  
 José Antonio Ojalvo  
 Belinda Och  
 Alicia Ortega  
 Julián Panadero  
 Deseada Parejo Mora  
 Gregorio Parra  
 Bettina Perales  
 David Pérez  
 José Luis Pérez  
 Juan José Pérez  
 José Luis Pérez Chiscano  
 Jesús S. Porras Mateos  
 Javier Prieta Díaz  
 Francisco Prieto

Juan Pablo Prieto Clemente  
 Luis Manuel Pulido  
 Juan Manuel Pulido Cuadrado  
 Manuel Querol  
 Víctor Manuel Quintana  
 Soraya Ramiro  
 Diego Recio  
 Darren Rees  
 Domingo Rivera  
 Milagros Rodríguez  
 Adolfo Rodríguez Pérez  
 Jesús Rojas  
 José Antonio Román  
 Miguel Romano  
 Luis Salguero Báez  
 Pedro Salguero Borrero  
 Roberto Sánchez  
 María Jesús Sánchez  
 Ismael Sánchez Expósito  
 Carmen Sánchez Espejo  
 Carlos Javier Sánchez Guerrero  
 Juan Manuel Sánchez Guzmán  
 Juan Francisco Sánchez Melilla  
 Joost Schamp  
 Godfried Schreur  
 Rafael Serra Naranjo  
 SEO-Monticola  
 Per Stensland  
 Marc Tailly  
 Álvaro Tejerina  
 José Luis Tella  
 Luis Tirado  
 Alejandro Torés  
 Ignacio Torres  
 The Travelling Naturalist  
 Jose María Traverso Martínez  
 Jesús Valiente López  
 José Luis Valiña  
 Ricardo Vázquez  
 Joaquín Vázquez Muñoz  
 Cristina Viar  
 César Vidal  
 Santiago Villa Méndez  
 Ana Were  
 Ángel Zarallo Moreno



## LISTADO DE HUMEDALES

Las aves acuáticas son las que más información aportan a los Anuarios Ornitológicos y en los humedales se producen muchos de los hechos noticiables de la ornitología. A continuación se enumeran los sitios más repetidos en este informe.

- Emb. de Arrocampo. Saucedilla. Oeste de Navalmoral de la Mata.
- Emb. de Arroyo Conejos. Llerena y Ahillones. Sureste de Badajoz.
- Emb. de Ayuela. Casas de Don Antonio. Sur de Cáceres.
- Emb. de Cornalvo. Río Albárregas. Noreste de Mérida.
- Emb. de Cubilar. Río Cubilar. Logrosán. Sureste de Cáceres.
- Emb. de El Borbollón. Río Árrago. Noreste de Cáceres.
- Emb. de Gabriel y Galán. Río Alagón. Granadilla. Norte de Cáceres.
- Emb. de Guadiloba. Río Guadiloba. Este de Cáceres ciudad.
- Emb. de Los Canchales. Mérida y La Garrovilla. Oeste de Mérida.
- Emb. de Orellana. Río Guadiana. Este de Badajoz.
- Emb. de Portaje. Torrejoncillo y Portaje. Sur de Coria.
- Emb. de Sierra Brava. Arroyo Pizarroso. Zorita. Sureste de Cáceres.
- Emb. de Talaván. Talaván. Cuatro Lugares. Norte de Cáceres ciudad.
- Emb. del Tozo. Río Tozo. Torrecillas de la Tiesa. Este de Trujillo.
- Emb. de Valdecaballeros. Río Guadalupejo. La Siberia. Este de Badajoz.
- Emb. de Valdecañas. Río Tajo. Este de Navalmoral de la Mata.
- Emb. de Valdesalor. Río Salor. Sur de Cáceres ciudad.
- Emb. de Valuengo. Jérez de los Caballeros. Suroeste de Badajoz.
- Lagunas de La Albuera, del Caballo o de Torre de Miguel Sesmero. Sureste de Badajoz ciudad.
- Laguna del Retamar. Torremejía. Sur de Mérida.
- Laguna de Valdeobispo. Valle del Alagón. Oeste de Plasencia.
- Charca de Casazafra. Sur de Cáceres ciudad.
- Charca y arrozales de Casas de Hitos. Madrigalejo. Sureste de Cáceres.
- Charcas de El Millar. Oeste de Cáceres ciudad.
- Charca de Judío y Moro. Sur de Plasencia.
- Charca de La Copa. Logrosán. Sureste de Cáceres.
- Charca de Lancho o del Ancho. Arroyo de la Luz. Oeste Cáceres ciudad.
- Charca de Los Barruecos. Malpartida de Cáceres. Oeste de Cáceres ciudad.
- Charco Salado. Casatejada. Oeste de Navalmoral de la Mata.
- Charca de Torrealba. Torremocha. Sureste de Cáceres ciudad.
- Arrozal de Galisteo. Valle del Alagón. Oeste de Plasencia.
- Arrozal de Gorbea. Logrosán. Sureste de Cáceres.
- Arrozales de Santa Amalia. Centro-norte de Badajoz.

